

Добавка дієтична комплексна «ЛОВЕР». Лист-вкладиш щодо застосування для споживачів.

Склад вмісту 1 кишковорозчинної капсули: життєздатні молочнокислі бактерії (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*), непатогенний ентерокок (*Streptococcus thermophilus*) не менше $1 \cdot 10^8$ КУО, біфідобактерії (*Bifidobacterium bifidum*, *B.longum*) $1 \cdot 10^8$ КУО, пропіоновокислі бактерії (*Propionibacterium freudenreichii*) $1 \cdot 10^8$ КУО, цинк – 15 мг (мг).

Поживна (харчова) цінність на 100 г/1 капсула: білки – 2,5 г / 0,05 г, вуглеводи, – 90 г(г) / 0,18 г(г), цукри – 0 г (г); сіль - 0 г (г).
Калорійність (енергетична цінність) на 100 г(г) / 1 капсулу: 378 ккал / 0,9 ккал.

Рекомендації щодо споживання: «ЛОВЕР» може бути рекомендований в якості харчової добавки, як додаткове джерело життєздатних бактерій та цинку для дорослих і дітей від 12 років. З метою усунення дисбактеріозу та підвищення місцевого і загального імунітету при інфекційно-запальних захворюваннях піхви (бактеріального вагінозу та захворювань, що передаються статевим шляхом). При використанні препаратів екстреної контрацепції, місцевих протимікробних препаратів або гормональних препаратів - аналогів прогестерону, системних глюкокортикостероїдів, барбітуратів, антибіотиків задля профілактики дисбактеріозу та запобігання виникнення антибіотико-асоційованої діареї. При станах після гінекологічних хірургічних втручань, хіміотерапії, променевої терапії, радіотерапії та при вагітності. При профілактиці та комплексній терапії дисбактеріозу, пов'язаному з гастроентеритами бактеріальної або вірусної природи. Для запобігання рецидиву у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями кишківника (хвороба Крона, виразковий коліт, інше). У пацієнтів з частими алергіями та/або atopічними захворюваннями. При гострих та хронічних дерматитах, дерматозах, вугровій хворобі, екземі, себореїному дерматиті, нейродерматиті, тощо. При синдромі подразненого кишківника та для пацієнтів з частими запорами з метою поліпшення мікрофлори і впливу на частоту дефекації та на консистенцію стільця.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: рекомендується дорослим та дітям старше 12 років по 1 капсулі 2 рази на добу до або під час вживання їжі. Якщо дитина або дорослий не може проковтнути капсулу, її вміст необхідно змішати у чайній ложці кип'яченої води, соку або молока кімнатної температури і відразу випити.

Термін вживання: 14 днів, в подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.

Застереження при застосуванні: підвищена особиста чутливість до окремих компонентів.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Застосування під час вагітності та годування груддю: дозволено застосування в період вагітності та годування груддю.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, недоступному для дітей місці, за температури від 2 °С до 6 °С.

Форма випуску: кишковорозчинні капсули № 20 по 10х2 у блістері та картонній упаковці.

Маса вмісту капсули: 100 мг (мг) $\pm$ 10,0 %.

Не є лікарським засобом.

Без ГМО

Мінімальний термін придатності або дата «Вжити до» (при терміні придатності: 12 місяців), номер партії: вказано на упаковці.

ТУУ 10.8-42952052-001:2019

Виробник: ДП «Ензим», Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул.Хлібозаводська, 2, тел.: +38 (0432) 32 92 49 на замовлення: ТОВ «Легер Фарма», Україна, 02081, м. Київ, вул. Урлівська, 23-Б, оф. 241, тел.: +38 (044) 239 26 41.

Ексклюзивний дистриб'ютор: ТОВ «Мобіль Медікал», Україна, 07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, пров. 1-го Травня, буд. 17-А. тел.: +38 (044) 353 80 02, www.mobil-medical.com.

Добавка диетическая комплексная «Ловер». Лист-вкладыш по применению для потребителей.

Состав содержимого 1 кишечнорастворимой капсулы: жизнеспособные молочнокислые бактерии (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*), непатогенный энтерококк (*Streptococcus thermophilus*) не менее $1 \cdot 10^8$ КОЕ, бифидобактерии (*Bifidobacterium bifidum*, *B. longum*) $1 \cdot 10^8$ КОЕ, пропионовокислые бактерии (*Propionibacterium freudenreichii*) $1 \cdot 10^8$ КОЕ, цинк - 15 мг (mg).

Питательная (пищевая) ценность на 100 г / 1 капсула: белки - 2,5 г / 0,05 г, углеводы - 90 г (г) / 0,18 г (г), сахара - 0 г (г); соль - 0 г (г). **Калорийность (энергетическая ценность)** на 100 г (г) / 1 капсулу: 378 ккал / 0,9 ккал.

Рекомендации по потреблению: «Ловер» рекомендован в качестве пищевой добавки, как дополнительный источник жизнеспособных бактерий и цинка для взрослых и детей от 12 лет. С целью устранения дисбактериоза и для повышения местного и общего иммунитета при инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища (бактериального вагиноза и заболеваний, передающихся половым путем). При использовании препаратов экстренной контрацепции, местных противомикробных препаратов, гормональных препаратов - аналогов прогестерона, системных глюкокортикостероидов, барбитуратов, антибиотиков для профилактики дисбактериоза и предотвращения возникновения антибиотико-ассоциированной диареи. При состояниях после гинекологических хирургических вмешательств, химио/ лучевой/ радиотерапии и при беременности. При профилактике и комплексной терапии дисбактериоза, связанного с гастроэнтеритами бактериальной или вирусной природы. Для предотвращения рецидива у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, прочее). У пациентов с частыми аллергиями и/или атопическими заболеваниями. При острых и хронических дерматитах, дерматозах, угревой болезни, экземе, себорейном дерматите, нейродерматите. При синдроме раздраженного кишечника и для пациентов с частыми запорами с целью улучшения микрофлоры и влияния на частоту дефекации и на консистенцию стула.

Способ применения и рекомендованная суточная доза: рекомендуется взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 2 раза в сутки, до или во время еды. Если ребенок или взрослый не может проглотить капсулу, ее содержание необходимо смешать в чайной ложке кипяченой воды, сока или молока комнатной температуры и сразу выпить.

Срок употребления: 14 дней, в дальнейшем срок употребления согласовывать с врачом.

Меры предосторожности: повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Применение во время беременности и кормления грудью: разрешено применение в период беременности и кормления грудью.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке производителя, в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 2 °С до 6 °С.

Форма выпуска: кишечнорастворимые капсулы № 20 по 10х2 в блистере и картонной упаковке.

Масса содержимого капсулы: 100 мг (mg) $\pm$ 10,0%.

Не является лекарственным средством.

Без ГМО

Минимальный срок годности или дата «Принять до» (при сроке годности: 12 месяцев), номер партии: указано на упаковке.
ТУУ 10.8-42952052-001:2019

Производитель: ДП «Энзим», Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Хлебозаводская, 2, тел.: +38 (0432) 32 92 49, по заказу ООО «Легер Фарма», Украина, 02081, г. Киев, ул. Урловская, 23-Б, оф. 241, тел.: +38 (044) 239 26 41.

Эксклюзивный дистрибьютор: ООО «Мобиль Медикал», Украина, 07354, Киевская область, Вышгородский район, с. Новые Петровцы, пер. 1-го Мая, д. 17-А. тел.: +38 (044) 353 80 02 www.mobil-medical.com.